


Localisation des données de Rémiz penduline en Saône-et-Loire de 1950 à 2010.

Le passage automnal (9 données) est très peu marqué et étalé de fin septembre (1 individu le 30.09.1997 à Montchanin) à mi-novembre (1 mâle adulte le 11.11.1993 à Charette) avec un petit pic dernière décade de septembre.



Phénologie saisonnière de la Rémiz penduline d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.

Le passage de printemps (7 données) est quant à lui est beaucoup plus localisé dans le temps entre la dernière décade de mars (3 individus le 23.03.1999 à Pierre-de-Bresse) et début mai (4 individus le 04.05.1981 à Beaurepaire-en-Bresse).

La moitié des observations concernent 1 ou 2 oiseaux avec un max. de 8 individus le 07.04.1996 à l'Étang Fouget à Ratenelle et de 9 individus le 18.10.2003 à La Chapelle-de-Bragny.

**Pas de donnée historique**

Jean-Marc FROLET


## ORIOLIDAE

### Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*

La sous-espèce type niche en Europe et en Afrique du nord. En France, nicheur et migrateur commun.

Nicheur commun dans toute la Saône-et-Loire en dehors peut-être du Bassin d'Autun et du Morvan, ce qui ne diffère pas beaucoup du statut qu'il avait à la moitié du siècle dernier. LA COMBLE & POTY (1958) le considéraient comme un nicheur répandu, commun en plaine, bien moins fréquent dans la montagne (Autunois), où il semblait plus commun autrefois.

Il est retrouvé dans les boisements de feuillus (forêt, parc, peupleraie et ripisylve des vallées alluviales).




Carte de répartition du Loriot d'Europe en période de nidification en Saône-et-Loire de 2000 à 2010.

Les premiers départs ont lieu fin juillet et progressivement les lieux de nidification sont désertés dans le mois d'août. La dernière observation date du 11.09.1994 à Saint-Cyr.

Les retours ne sont effectifs que la dernière décade du mois d'avril avec un pic très précoce la première décade de mai. Il existe quelques oiseaux précurseurs :

- 1 chanteur isolé le 29.03.1993 à Condal ;
- 1 chanteur isolé le 02.04.2002 à Gergy ;
- 1 chanteur isolé le 03.04.2001 à Fretterans ;
- 1 chanteur isolé le 04.04.1997 à Saint-Loup-de-la-Salle.



Phénologie saisonnière du Loriot d'Europe d'après les données de Saône-et-Loire de 1950 à 2010.

Les observations en groupe sont peu fréquentes, et dépassent rarement les 6 individus :

- 8 individus le 22.06.2001 à Montcony.

### Évolution

En Bourgogne, entre 2002 et 2008, les effectifs de Loriot d'Europe se sont accrus de façon significative (+64 %) (MEZANI, 2008). Entre 2008 et 2009, on note une diminution peu significative (-15 %).

Frédéric TILLIER & Jean-Marc FROLET