

# Pontia daplidice (Linnaeus, 1758)

## le Marbré-de-vert

### Statut

RE

CR

EN

VU

NT

Bourgogne

LC

DD

NA

Franche-Comté


NE

Europe – LC  
France – LC

### Difficulté de détermination



### Diagramme écologique



Claude VOINOT



Mâle (Nièvre, 2010).

### Écologie et biologie

Le Marbré-de-vert est une espèce atlanto-méditerranéenne thermophile, de réputation migratrice, dont la présence est sporadique hors de la région méditerranéenne. Cependant, il semble que ses cycles migratoires sud-nord soient beaucoup plus rares qu'au cours de la première moitié du XX<sup>e</sup> siècle. Un renouveau, avec possibilité de fixation locale, se fait remarquer au XXI<sup>e</sup> siècle. Cependant, les observations majoritaires et presque régulières sur les prairies sablonneuses du lit mineur de la Loire suggèrent qu'elle soit inféodée à une Brassicacée particulière (Passerage ?) et non au Réséda habituel.

### Description et risques de confusion

Une attention soutenue est une première condition nécessaire afin de la repérer en vol. L'espèce évolue en mélange avec d'autres Piérides blanches aux effectifs bien plus fournis ; toutefois, son vol est plus rapide et plus bas. Il faut concentrer son attention sur les dessins noirs plus étendus. Le mâle est dépourvu de macule noire dans l'espace 1. Au repos, le revers des ailes aux motifs verts assez étendus est caractéristique, de sorte que les risques de confusion avec la femelle de l'Aurore restent très limités.

### Distribution

*P. daplidice* a été signalé plusieurs fois par le passé dans nos régions, à la fin du XIX<sup>e</sup> siècle dans l'Yonne (MABILLE, 1864), puis en 1899 en Côte-d'Or (coll. MNHD) ; on connaît également

un certain nombre de données concernant la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire, jusqu'en 1960 (coll. FROCHOT). À la fin du XX<sup>e</sup> siècle, DUTREIX (DUTREIX, 1988) relevait l'absence de données contemporaines. Il a fallu attendre 2004 pour observer une première femelle sur un coteau de nature métamorphique dans l'Ouest de la Saône-et-Loire (Crécy-sur-Somme, R. ESSAYAN). Depuis, des prospections assidues sur les prairies alluviales sèches des bords de la Loire ont procuré des observations presque régulières, de 2006 à 2011 (R. ESSAYAN, C. VOINOT), ainsi que d'une femelle inattendue près de Dijon. Il y a lieu de noter qu'aucune observation n'a été effectuée en aval de Nevers.

Il n'existe aucune donnée contemporaine validée en Franche-Comté.

### Phénologie

Espèce qui semble bivoltine, avec au moins un développement larvaire autochtone.

Dates extrêmes : 23 mai – 15 septembre.

### Atteintes et menaces

L'espèce atteint en Bourgogne la limite nord-est de sa répartition. Son habitat des bords de la Loire ne semble pas menacé et sa présence en Bourgogne dépend surtout d'une dynamique favorable des populations évoluant au sud-ouest de la région.

### Orientations de gestion et mesures conservatoires

Hormis le maintien des prairies alluviales des bords de Loire, il importe de suivre la dynamique de cette espèce, afin d'en préciser le statut dans les années futures.

Claude VOINOT



Femelle (Nièvre, 2011).

Claude VOINOT



Femelle (Nièvre, 2011).

Claude VOINOT




Couple, parade, femelle au sol (Nièvre, 2011).


Claude VOINOT



Couple (Nièvre, 2011).



Phénologie de *Pontia daplidice*.



Distribution de *Pontia daplidice* en Bourgogne et Franche-Comté.