

# Pseudophilotes baton (Linnaeus, 1758)

## l'Azuré du Thym

### Statut

RE

CR

EN Franche-Comté

VU Bourgogne

NT

LC

DD

NA

NE

Europe – LC  
France – LC

L'Azuré du Thym reste très rare et en forte régression dans les deux régions, quand bien même son état de conservation semble un peu plus favorable en Bourgogne.

Denis JIGON



Mâle (Haute-Saône, 1999).

### Écologie et biologie

L'Azuré du Thym appartient au cortège xérophile et préférentiellement calcicole. Sténoèce, il se révèle extrêmement localisé, restreint à de petites stations de quelques mètres carrés pourvues d'une végétation rase, souvent perchées au sommet des plateaux, dans leur partie la plus chaude et la plus ensoleillée, au niveau de petits effondrements de terrain ou des coulées tracées par le gibier. Peu actif, il se déplace au ras du sol et butine thym et serpolets, en particulier le Thym aromatique (*Thymus vulgaris*), le Serpolet précoce (*Thymus praecox*) et le Thym de bergère (ou Serpolet commun, *Thymus pulegioides*), plantes-hôtes de la chenille, qui observe par ailleurs des mœurs myrmécophiles. Les imagos volent isolément et leur petite taille les rend peu repérables parmi la végétation.

### Description et risques de confusion

Très petit (la longueur de l'aile antérieure est inférieure à 12 mm), l'adulte de *P. baton* se caractérise par sa face supérieure bleu pâle, ornée d'une virgule discoïdale noire sur chaque aile chez le mâle, et brune chez la femelle, légèrement suffusée de bleu dans l'aire basale. Les individus des deux sexes présentent des franges blanches entrecoupées de noir au niveau de l'extrémité des nervures, et une série de points noirs submarginaux aux ailes postérieures. Le revers, gris moyen, assez fortement ponctué de noir, porte une rangée de lunules submarginales orange enserrées entre deux séries de motifs noirs.

Il n'existe pas d'espèce proche sous nos latitudes.

### Distribution

Espèce ouest-européenne, commune dans le Midi mais de répartition disjointe dans la moitié Nord de la France.

À l'échelle des régions, même constat : l'espèce est plus répandue dans le sud que dans le nord.

En Franche-Comté, de nombreuses stations sont connues du sud du Jura, autour de la vallée de l'Ain ; en Bourgogne les populations occupent principalement le sud de la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire.

Les données procèdent souvent de l'observation d'individus isolés.

### Phénologie

Espèce bivoltine, se montrant surtout en mai-juin, puis très parcimonieusement en août.

Dates extrêmes : 22 avril – 31 août.


### Atteintes et menaces

Comme c'est le cas dans plusieurs sites de la Petite Montagne, certaines populations régressent dans les pelouses par suite du développement des graminées sociales (Brachypodes, notamment) consécutif à l'abandon des pratiques de pâturage. Dans ce cas de figure, les serpolets sont en effet rapidement étouffés sous l'épais manteau de Poacées. À cela s'ajoutent pour ce papillon les risques liés à l'isolement des toutes petites populations.

### Difficulté de détermination



### Diagramme écologique



Claude VOINOT



Mâle (Côte-d'Or, 2010).

Claude VOINOT



Femelle (Côte-d'Or, 2010).

Claude VOINOT



Femelle (Côte-d'Or, 2010).

Alexandre RUFFONI




Mâle (Côte-d'Or, 2010).


Pascalie et Michel GUINCHARD



Accouplement, femelle à droite (Jura, 2009).



Phénologie de *Pseudophilotes baton*.



Distribution de *Pseudophilotes baton* en Bourgogne et Franche-Comté.