

Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)

le Fadet de la Mélique

L'Iphis (ou Fadet de la Mélique) est globalement en régression en Bourgogne comme en Franche-Comté.

Claude YONOR



Mâle (Côte-d'Or, 2008).

Statut

RE

CR

EN

VU

NT

Bourgogne
Franche-Comté

LC

DD

NA


NE

Europe – LC
France – LC

Difficulté de détermination



Diagramme écologique



Écologie et biologie

Calcaricole non strict, hôte des prairies sèches, des vastes milieux ouverts parsemés de buissons, l'Iphis a fortement chuté en densité depuis une vingtaine d'années. Il volette au-dessus des pelouses à Brome dressé (*Bromus erectus*), se posant toujours ailes relevées parmi les épis, comme tous les Fadets, tout en visitant assez rarement les fleurs. Bien que les larves se nourrissent de Poacées banales (Brachypodes, Mélique, Fétuques, Brome dressé), on observe un continuuel recul de l'espèce. D'autres facteurs, indirects, doivent être recherchés pour expliquer sa sévère régression.

Description et risques de confusion

Le mâle paraît sombre en vol en raison de la teinte du dessus des ailes. La femelle, plus rousse, possède une série complète d'ocelles submarginiaux. *C. glycerion* est caractérisé par deux macules blanches au revers des ailes postérieures, macules ne touchant jamais le bord costal. Dans le Jura, l'espèce est d'aspect plus gris sur le dessous, avec une ocellation plus vestigiale.

En vol, la femelle peut être confondue avec le Fadet commun. Posée, elle n'offre en principe aucune difficulté de détermination une fois que l'on connaît les critères distinctifs. Des confusions fréquentes sont toutefois commises par les débutants dans les stations où il côtoie le Fadet des tourbières (*Coenonympha tullia*), pourtant plus gros et dont la tache blanche du dessous des ailes postérieures atteint le bord costal.

Distribution

C. glycerion est une espèce euro-sibérienne sarmatique arrivant en limite d'expansion occidentale en Bourgogne, et préférant nettement les pelouses calcariques. Elle a disparu de nombreuses stations périphériques (dont une anecdotique petite population sur une jachère de l'extrême nord de l'Yonne, à Vallières, vue en 1989), dans l'Yonne, la Nièvre et la quasi-totalité du massif morvandiau. De très petites populations isolées ont été trouvées sur des parcelles péri-morvandelles, sur substrat siliceux. Les populations sont actuellement centrées sur les plateaux calcaires, en Bourgogne et en Franche-Comté, où *C. glycerion* occupe surtout les zones d'altitude. L'Iphis peut fréquenter les prairies para-tourbeuses dans le Jura et dépasse 1280 m d'altitude (Jura : Lajoux, Forêt du Masacre ; Ain, col de la Faucille, 1330 m).

Phénologie

Espèce univoltine, se montrant de juin à la mi-juillet.

Dates extrêmes : (26 avril 2005)
8 mai – 4 août (18 août 1982).

Atteintes et menaces

Cette espèce qui se réfugie souvent dans des milieux herbacés extensifs peu anthropisés est impactée par la dégradation directe ou indirecte de ses habitats : embroussaillage, enrénement, enrichissement des terres, drainages... De petites populations isolées, par exemple en sommet de butte calcaire, semblent pouvoir se maintenir sans échanges génétiques apparents.

Orientations de gestion et mesures conservatoires

Le maintien des pratiques agricoles extensives est indispensable à la survie de l'espèce. Il convient en ce sens de préserver des réseaux de prairies sèches en favorisant un pâturage léger et une fauche hivernale partielle. Il ressort en effet que ce papillon apprécie la présence de faciès herbacés assez hauts. Il trouve d'ailleurs souvent refuge dans divers petits habitats de ce type inclus au sein de formations herbacées plus rases, notamment au pied des buissons en pelouses sèches.

Jean-François MARADAN



Mâle (Doubs, 2009).

Claude VOINOT



Femelle (Côte-d'Or, 2009).

Denis JIGAN



Mâle (Haute-Saône, 2011).

Denis JIGAN




Femelle (Haute-Saône, 2009).


Pascalie et Michel GUINCHARD



Mâle (Jura, 2009).



Phénologie de *Coenonympha glycerion*.



Distribution de *Coenonympha glycerion* en Bourgogne et Franche-Comté.