

LE BLAIREAU EUROPÉEN



CLASSE	ORDRE	FAMILLE	GENRE	ESPÈCE	NOM SCIENTIFIQUE
Mammifères	Carnivores	Mustélidés	Meles	meles	Meles meles

Blaireau



Taille (tête et corps) : 61 - 72 cm
Queue : 15 - 20 cm
Poids : 9 - 20 kg (mâle) et 6,5 - 14 kg (femelle)



Ludovic Jouve

Morphologie

Un corps massif, des pattes robustes et une queue courte donnent au blaireau une allure typique qu'il est impossible de confondre. Le corps est couvert d'une fourrure grise faite de longs poils raides. La tête a trois bandes blanches et deux noires très visibles qui encadrent les deux yeux. Même si le mâle est plus gros que la femelle, il est très difficile de les différencier.

Habitat

Le blaireau creuse ses terriers en rupture de pente, dans des roches, dans une haie, un bosquet et pour la majorité en pleine forêt. Animal fouisseur et nocturne, ce terrassier creuse et habite des terriers profonds et complexes, des « blaireautières » ou « tessonnières », pouvant avoir plusieurs dizaines de gueules ou entrées. À la différence du terrier du renard, les entrées sont prolongées par une petite rigole formée par le passage régulier des animaux.

Période de reproduction

Vivant en clans, les blaireaux sont les plus sociaux de nos carnivores. La taille et la composition de cette communauté peuvent être variables allant jusqu'à une douzaine d'individus. La blairelle donne naissance en moyenne à deux ou trois jeunes en février. La reproduction a lieu juste après la mise bas. Le développement de l'embryon est stoppé dix mois, pour ne reprendre que l'hiver suivant. Les blaireautins effectuent leurs premières sorties dès l'âge de deux mois et ils atteignent leur taille adulte à sept mois.

Régime alimentaire

Le blaireau est plus un cueilleur qu'un chasseur-prédateur. Il est omnivore et apprécie particulièrement les vers de terre, les fruits, les tubercules et les céréales. Il consomme également des petits mammifères tels que des rongeurs et des musaraignes mais aussi des insectes, des mollusques, des amphibiens et même des champignons !



Daniel SIRIUCU

Empreintes de Blaireau dans la neige

Répartition géographique

En France métropolitaine, le blaireau est commun, on le trouve dans tous les départements mais réparti de façon inégale. Le blaireau est bien présent en Bourgogne.

Réseau trophique

Le blaireau n'a généralement pas de prédateur. Ses populations peuvent en revanche être affectées par les activités humaines.

Relation avec l'Homme

En Côte-d'Or, il fait l'objet de campagnes d'éradication dans les secteurs où sévit la tuberculose bovine, maladie à l'origine transmise par les vaches, qu'il peut contracter et propager (comme le sanglier ou le cerf). On le croise souvent sur le bord des routes, la nuit, dont il est une victime du trafic. Il peut occasionner des dégâts aux cultures et faire en conséquence l'objet de destructions.

Rends-toi pages 70 à 73 de ce BNj pour plus d'infos !