

Note d'identification E-Observations

Ma grenouille « brune »... est-elle « rousse » ?

Le groupe des grenouilles dites « brunes » comprend en Bourgogne 2 espèces proches, utilisant des milieux parfois similaires. Elles se distinguent des autres grenouilles, notamment des individus sombres de Grenouilles vertes, par :

- 1** - une robe brune, sans aucune trace de couleur verte, **2** - la présence d'un « masque » toujours sombre derrière l'œil,
- 3** - l'absence de ligne vertébrale claire et **4** - une période de reproduction très précoce (Janvier/Mars).

Attention : les critères ci-dessous sont souvent difficiles à juger et très variables, d'où l'importance de les cumuler ; une identification fiable reste toutefois délicate.

Grenouille agile
Rana dalmatina

Grenouille rousse
Rana temporaria



Tympan

Grand et proche de l'œil

Moyen et plus distant de l'œil



Museau

Long et pointu

Court, arrondi et busqué



!
En cas de baisse de niveau d'eau ou de décrochement du substrat, la ponte peut se retrouver à la surface comme pour la Grenouille rousse

Ponte

Isolée, non affleurante, accrochée à des supports sous la surface (quelques cm à dizaines de cm)



!
Sur certains sites, il n'y a que quelques pontes isolées, notamment si les effectifs de grenouilles sont faibles

Disposée en vastes frayères, affleurante et libre dans la lame d'eau

Un autre critère plus dur à voir est la face ventrale, d'un blanc immaculé chez la Grenouille agile et tachée ou marbrée chez la rousse.

Attention, la manipulation de ces deux espèces est réservée aux personnes détentrices d'une autorisation de capture. Pour les personnes concernées, d'autres critères peuvent être observés : la face ventrale, la couleur des callosités en période de reproduction chez les mâles et le test de la patte qui peut toujours apporter des informations mais à éviter pour ne pas blesser les individus (et peu fiable).

Enfin, leurs chants, disponibles ICI, sont caractéristiques.