

Note d'identification E-Observations

Milan noir ou Milan royal ?

Milan noir (*Milvus migrans*) et Milan royal (*Milvus milvus*) sont des rapaces souvent confondus. Pourtant les identifier se fait aisément avec un peu d'expérience et de bonnes conditions d'observation. Ces deux espèces migratrices se reproduisent en Bourgogne. La majorité des milans noirs hivernent en Afrique tandis que le Milan royal migre partiellement. Une partie passant l'hiver en France, ce dernier peut s'observer en hiver dans notre région.

Milan noir


Milan royal



Queue



Le critère peut varier avec les conditions d'observation : posture de l'oiseau, si les plumes de la queue sont resserrées, lors de la mue ou d'une perte de plumes... Bien observer l'échancrure confirme l'identification du Milan royal.



Plumage



Panneaux alaires (« fenêtres »)



Nombre de digitations (« doigts »)



Le critère peut varier avec les conditions d'observation : invalide lors de la mue ou de la perte d'une plume, ou difficile si les rémiges sont resserrées... Voir 6 digitations confirme le Milan noir mais en voir 5 ne confirme pas toujours le Milan royal.

Il est bien de recouper plusieurs critères pour identifier. Les cris peuvent aussi aider (voir Milan noir et Milan royal) ainsi que la couleur de la tête, toujours pâle chez le Milan royal et variable chez le Milan noir (brune, grisâtre ou pâle). Attention, la distinction avec la Buse variable (*Buteo buteo*) peut être difficile sous certaines conditions. Un critère facile est la forme de la queue, arrondie pour la Buse variable.